



КОПИЯ
ВЕРНА

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№1316 от « 26 » декабря 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Сельхозхимия», ОГРН 1066164204930

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

(наименование пестицида или агрохимиката)

Абига-Пик, ВС (400 г/л хлорокиси меди)


получил государственную регистрацию за № 407-02-1316-1

на срок по « 25 » декабря 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

П.А. Чекмарев
(подпись)



№001496



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2,9-3,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,4%-ом рабочим раствором. Расход рабочей жидкости- 400 л/га	20(5)
2,8-4,8 (в зависимости от степени развития болезни)	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	20(3)
3,2-4,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации 0,4%-ом рабочим раствором. Расход рабочей жидкости- 400-600 л/га	20(4)
3	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, антракноз, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-800-1000 л/га	20(3)
3	Лук всех генераций	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-300-400 л/га	20(3)
2,8	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз	Опрыскивание по всходам и в фазе «елочки» 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	-(2)
7,8	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-800-1000 л/га	30(6)
4,8-9,6 (в зависимости от степени развития болезни)	Яблоня, груша, айва	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 1500 л/га	30(4)
	Слива, персик, абрикос, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость		
2,4-4,4	Лаванда	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-500 л/га	20(3)
3,6	Паслен дольчатый	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-500 л/га	20(2)
2,4	Наперстянка шерстистая, мята перечная	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-300 л/га	20(2)
2,9	Подорожник большой	Ржавчина белая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-300 л/га	20(2)
3	Лапчатка белая	Ржавчина	Опрыскивание 2-кратно на 1-м и 2-м году вегетации. Расход рабочей жидкости-300 л/га	(-)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Абига-Пик, ВС (400 г/л хлорокись меди) от 26 декабря 2016 г. № 1316

1	2	3	4	5
2,4-9,6 (в зависимости от степени развития болезни)	Лиственные и хвойные	Ржавчина	Опрыскивание период вегетации 0,4-1 % -м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости-500-1000 л/га	-(1)
	Тополь, осина	Цитоспороз		

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата, л/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
50 г/10 л воды	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5 % -м рабочим раствором	20(5)
	Свекла сахарная	Церкоспороз		20(3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость		20(4)
50 г/10 л воды	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, антракноз, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5 % -м рабочим раствором	20(3)
	Лук	Пероноспороз		
40 г/10 л воды	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30(6)
50 г/10 л воды	Яблоня, груша, айва	Парша, монилиоз		30(4)
40-50 г/10 л воды	Слива, персик, абрикос, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость		30(4)
	Декоративные и цветочные культуры	Ржавчина, пятнистости		

Запрещено применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом.

Сроки выхода для ручных (механизированных) работ – 3/3.

Директор Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

