



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 393 от « 8 » июля 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «МосАгро», ОГРН 1057747879342

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Агролекарь, КЭ (250 г/л пропиконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 175-02-393-1

на срок по « 7 » июля 2024 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации  
и защиты растений П.А. Чекмарев



№000444





Для личных подсобных хозяйств:

| Норма применения препарата, л/га | Культура                    | Вредный объект                                                                                              | Способ, время, особенности применения препарата                                                                        | Срок ожидания<br><br>(кратность обработок) |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                      | 5                                          |
| 7-10 мл/10 л воды                | Земляника                   | Серая гниль, мучнистая роса                                                                                 | Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 1,5 л/10 м <sup>2</sup>   | 20(2)                                      |
|                                  | Смородина черная, крыжовник | Мучнистая роса, ржавчина столбчатая, ржавчина бокальчатая, антракноз, септориоз (белая пятнистость листьев) | Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/куст              |                                            |
|                                  | Малина                      | Пурпуровая пятнистость, антракноз, септориоз листьев, ржавчина листьев                                      | Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 0,8-1 л/10 м <sup>2</sup> |                                            |

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения ручных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата:  
авиационным методом;  
в сельскохозяйственном производстве;  
в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

