

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
150-200 г/1000 м <sup>3</sup>	Помещение под картофель	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация после загрузки на хранение	-(1)
0,01-0,05	Картофель (семенной)		Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках - 0,3 м; насыпью - 0,5 м в хранилищах без вентиляции	
0,005-0,01	Картофель (продовольственный)			7(1)
0,01-0,05	Картофель (семенной)	Ризоктониоз	Фумигация картофеля перед посадкой	-(1)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
5 г/25 м <sup>3</sup>	Картофель (семенной), картофель (продовольственный) в погребах или подвалах, расположенных под нежилыми помещениями	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация после загрузки на хранение	7(1)

Сроки безопасного выхода в обработанные помещения, в том числе для личных подсобных хозяйств – 1 сутки.

Запрещается применение препарата:  
авиационным методом;  
в водоохранной зоне водных объектов.

